

如何預防？

陶瓷作業除有粉塵危害外，使用釉料過程可能伴隨重金屬之暴露

1. 有效隔離作業環境，採用密閉生產或裝設局部排氣設備、集塵裝置。
2. 定期健康檢查及健康管理，包含新進勞工體檢、特殊健康檢查。
3. 提供勞工必要之安全衛生教育訓練及知識。
4. 提供勞工適當、充足之個人防護具(呼吸道、皮膚防護等)。



如果您懷疑身體不適跟工作有關，可至職業傷病防治中心尋求協助

各區職業傷病防治中心聯絡窗口

長庚醫療財團法人
林口長庚紀念醫院
☎ 03-3498765

國立臺灣大學醫學院附設醫院
☎ 02-23123456 分機 67067

臺北榮民總醫院
☎ 02-55681084

中國醫藥大學附設醫院
☎ 04-22052121 分機 4509

中山醫學大學附設醫院
☎ 04-24739595 分機 56208

彰化基督教醫療財團法人
彰化基督教醫院
☎ 04-7238595 分機 4131


國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院
☎ 05-6330002 分機 8131

國立成功大學醫學院附設醫院
☎ 06-2353535 分機 4939

高雄醫學大學附設中和紀念醫院
☎ 07-3133604 分機 37

佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院
☎ 03-8462972

矽肺症， 不可輕忽的粉塵危害！



勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

甚麼是矽肺症？

矽肺症屬塵肺症的一種，主因為吸入結晶型游離二氧化矽粉塵所致，常見的塵肺症還包括「石綿肺症」、「煤礦工人塵肺病」等。



可能暴露行業

採礦業、石材切割加工、噴砂業、鑄造業、陶瓷業、釉業、鍋爐業等。



陶瓷修坯過程暴露粉塵



噴釉作業過程粉塵瀰漫
(無設置噴漆水洗台)

案例

楊先生從事瓷器製造30年（65年~95年），工作內容包括：拌粉、注漿、噴釉、浸釉及廢棄物處理等，作業時可見粉塵溢散，且環境地面佈滿粉塵。楊先生多年來持續有咳嗽、胸悶等症狀，且表示走路超過100公尺就會喘；今年初因症狀加重故至傷病防治中心求診，經職業醫學專科醫師調查及認定，診斷為職業性矽肺症。



個案因工作30年，長期暴露於含二氧化矽的粉塵環境，胸部X光呈現典型矽肺症變化

職業疾病認定流程



準備相關病歷及蒐集工作暴露資料
(如投保明細)

01



至職業醫學科門診進行職業疾病認定

02



若與工作相關，由職業醫學專科醫師開立診斷書

03



向勞保局申請保險給付及津貼補助

04

